

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 3-9-65 4

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

ABONNEMENT ANNUEL

(Tél. 72-58-72)

(AUDE, AVEYRON, GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 16, rue de la République - MONTPELLIER.

C. C. P. : MONTPELLIER 5.238-57

15 F

N° 60 - Septembre
1965/42

MOUCHE DES FRUITS

Après une très longue période d'arrêt, nous enregistrons la capture de quelques insectes par trois postes de piégeages (Hérault et Pyrénées Orientales).

Il est vraisemblable que les chaudes journées de la fin d'Août auront été favorables à l'évolution de la mouche des fruits.

C'est pourquoi les cultures fruitières dont la récolte interviendra au cours des prochaines semaines doivent recevoir une protection. Selon la date de la cueillette, utiliser un des produits ci-après énumérés :

D.D.T. - 250 grammes de matière active - 15 jours avant la récolte						
D.D.D. - 175 g	"	"	7 jours	"	"	"
Métoxychlore - 250g	"	"	"	"	"	"
Malathion - 100 g	"	"	"	"	"	"
Trichlorfon - 100 g	"	"	"	"	"	"
Diméthoate - 30 g	"	"	"	"	"	"
Fenthion - 100 g	"	"	"	"	"	"

Les vergers situés à proximité d'agglomérations ou de dépôts d'ordures doivent être particulièrement protégés jusqu'à l'enlèvement des fruits.

TORDEUSE ORIENTALE

L'insecte est présent dans toutes les régions. Les pêches tardives, les poires, les pommes doivent être protégées. Sur poires et pommes choisir un insecticide qui assurera en même temps la protection contre le Carpocapse.

ZEUZERE

Continuer les traitements ; ne pas oublier de traiter les arbres dont la récolte a été enlevée.

L'Inspecteur de la P.V.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles

P. BERVILLE

LL. TROUILLON

M. BEZUT

P 176

CULTURES LEGUMIERES DE PLEIN CHAMP

AVERTISSEMENT

TOMATES DE CONSERVE

Alternaria

Des orages localisés ont eu lieu dans plusieurs communes du Gard et de l'Hérault.

Dans les secteurs intéressés où ces précipitations peuvent aggraver les attaques déjà existantes, il convient d'exécuter des traitements fongicides dans les plus courts délais.

Nous rappelons que les produits suivants sont parmi les plus efficaces : Manèbe, Mancozèbe, Phaltane, Zirame et organo-cupriques riches en Zinèbe.

INFORMATIONS

POIREAUX

Teigne

La Teigne du poireau manifestant une forte activité, nous recommandons de poursuivre les traitements comme indiqué dans les précédents bulletins.

CELERI

Septoriose

En raison des périodes orageuses possibles, faire des traitements avec un fongicide organique de synthèse.

Mouche

Ajouter un insecticide : ester phosphorique autorisé en culture maraîchère pour éviter les dégâts.

P. CHERSTIAN,